



## Przychodnia Weterynaryjna REDVET

ul. Słowiańska 18  
59-920 Bogatynia  
Telefon: 782 180 202  
E-mail: info@redvet.pl

### Zwierzę

#### Argo

Gatunek: Pies  
Rasa: Mieszaniec  
Płeć: samiec  
Wiek: 9 lat  
Oznakowanie:  
Maść: czarna podpalana  
Waga: 22 kg

### Właściciel

#### Hundefreude - Ich Will Leben! E.v.

ul. Erste Südwieke 310  
26842 Ostrhauderfehn  
  
Telefon: +4915903006373  
E-mail: sandra144.14@o2.pl  
Lekarz prowadzący: Marta Górnik

## Karta informacyjna wizyty

27/12/2021 12:09: BADANIE

### OPIS WYWIADU

Bardzo mocno ropiało oko, zaczęło się dwa miesiące temu, miał zakrapiane i się polepszyło, oczy zmieniają wygląd; poza tym jest zdrowy;

### OPIS BADANIA

Zapalenie błony naczyniowej w obydwu oczach; możliwe tło wtórne (od zębów).  
Doxybactin 400 mg  
Sibone 2 op

### ZABIEGI

Wizyta - badanie okulistyczne  
Premedykacja/sedacja: farmakologiczne uspokojenie zwierzęcia  
RTG- stomatologia

### ZASTOSOWANE LEKI

SEDATOR 10 ML INJ.	0.3	ml
MORPHASOL 10MG/ML 20 ML ROZTWOR DO WSTRZYKIWANIA DLA	0.3	ml
Atipam inj 5mg/ml	0.3	ml
Rheumocam 2,5mg tabl.	20	tabl

### ZALECENIA

Doxybactin 400 mg po 0,5 tab dziennie  
Sibone po 1 tab dziennie  
Rheumocam 2.5 mg po 0,5 tab dziennie

Zaleca się kontrolę po ok 2-3 tyg leczenia i zabieg stomatologiczny.

## Google - Übersetzung

### BESCHREIBUNG DES INTERVIEWS – ARGO

Das Auge war sehr wund, es begann vor zwei Monaten, er hatte Flecken und es wurde besser, die Augen veränderten das Aussehen; sonst ist er gesund;

TESTBESCHREIBUNG Uveitis in beiden Augen; möglicher sekundärer Hintergrund (von den Zähnen).

Doxybactin 400 mg Sibone 2 op

BEHANDLUNGEN Besuch - augenärztliche Untersuchung

Prämedikation / Sedierung: Sedierung des Tieres pharmakologisch Röntgenzahnheilkunde

VERWENDETE DROGEN SEDATOR 10 ML INJ. 0,3 ml MORPHASOL 10MG / ML 20 ML LÖSUNG ZUR INJEKTION FÜR 0,3 ml Atipam inj 5 mg / ml 0,3 ml Rheumocam 2,5 mg Tabl. 20 Tabletten EMPFEHLUNGEN Doxybactin 400 mg bei 0,5 Tabletten pro Tag Sibone für 1 Tablette pro Tag Rheumocam 2,5 mg, 0,5 Tabletten pro Tag

Es wird empfohlen, nach 2-3 Behandlungswochen eine Kontrolle und eine zahnärztliche Behandlung durchführen zu lassen.