



## Przychodnia Weterynaryjna REDVET

ul. Słowiańska 18  
59-920 Bogatynia  
Telefon: 782 180 202  
E-mail: info@redvet.pl

### Zwierzę

#### Ben

Gatunek: Pies  
Rasa: Mieszaniec  
Płeć: samiec  
Wiek: 5 lat  
Oznakowanie:  
Maść: ruda  
Waga: 10 kg

### Właściciel

#### Hundefreude - Ich Will Leben! E.v.

ul. Erste Südwieke 310  
26842 Ostrhauderfehn

Telefon: +4915903006373  
E-mail: sandra144.14@o2.pl  
Lekarz prowadzący: Marta Górnik

## Karta informacyjna wizyty

27/12/2021 12:18: BADANIE

### OPIS WYWIADU

Trafił z pokrzywionymi kończynami do schroniska we wrześniu tego roku, nie miał wykonywanych żadnych badań, kończyny sprawiają mu ból.

### OPIS BADANIA

Stan po przedwczesnym zamknięciu stref wzrostu obydwu kości łokciowych. Diagnoza: Radius curvus. Optymalnym terminem na leczenie tej przypadłości jest 5-7 mies życia. Należy mieć na uwadze, że zabieg wykonany w późniejszym wieku, mimo prawidłowego przywrócenia osi kończyny, może nie zniwelować kulawizny, jeśli uszkodzenia chrząstek w stawie łokciowych doprowadziły do odstonięcia włókien bólowych. Aby doprowadzić do prawidłowego kształtu kończyny należy w każdej kończynie piersiowej wykonać osteotomię korekcyjną z zespoleniem kości przy pomocy płyt ortopedycznych lub stabilizatora zewnętrznego.

### ZABIEGI

Wizyta - badanie ortopedyczne  
Premedykacja/sedacja: farmakologiczne uspokojenie zwierzęcia  
RTG - Kolejna projekcja 4  
RTG - Pierwsza projekcja

### ZASTOSOWANE LEKI

SEDATOR 10 ML INJ. 0.2 ml  
MORPHASOL 10MG/ML 20 ML ROZTWOR DO WSTRZYKIWANIA DLA 0.2 ml

## Google - Übersetzung

### BESCHREIBUNG DES INTERVIEWS - BEN

Er kam im September dieses Jahres mit krummen Gliedmaßen ins Tierheim, er hatte keine Tests machen lassen, seine Glieder tun ihm weh.

TESTBESCHREIBUNG Zustand nach vorzeitigem Verschluss der Wachstumszonen beider Ulnaknochen.

Diagnose: Radius Curvus.

Der optimale Zeitpunkt für die Behandlung dieser Erkrankung liegt im Alter von 5-7 Monaten. Es ist zu bedenken, dass der Eingriff trotz korrekter Wiederherstellung der Gliedmaßenachse in einem späteren Alter durchgeführt wurde, kann die Lahmheit nicht korrigieren, wenn Knorpelschäden im Ellenbogengelenk freigelegt sind Schmerzfasern. Um die richtige Form der Gliedmaße zu erreichen, ist es notwendig, jede Gliedmaße in der Brust zu verwenden.

Durchführung einer Korrekturosteotomie mit Knochenfusion mit orthopädischen Platten oder einem Stabilisator extern.

BEHANDLUNGEN Besuch - orthopädische Untersuchung

Prämedikation / Sedierung: Sedierung des Tieres pharmakologisch Röntgen - Eine andere Projektion 4 Röntgen - Erste Projektion

VERWENDETE DROGEN SEDATOR 10 ML INJ. 0,2 ml MORPHASOL 10MG / ML 20 ML LÖSUNG ZUR INJEKTION FÜR 0,2 ml